



## IMMÉDIATEMENT

### En cas de projection cutanée

- **Rincer** à l'eau pendant au moins **15 minutes**.
- **Appeler le SAMU** si la surface contaminée est > 10 % de la surface corporelle (10 % = tête ou membres supérieurs).

### En cas de projection oculaire

- **Rincer abondamment** à l'eau courante pendant au moins **5 minutes** en écartant les paupières, tête inclinée vers le bas.
- Les lentilles cornéennes s'éliminent lors du lavage sinon ne pas tenter de les retirer.
- **Ne pas utiliser de collyre** ou de solutions oculaires.
- **Toujours consulter un ophtalmologiste.**

### En cas d'inhalation de vapeurs

- **Sortir** du local contaminé, aller à l'air libre.
- **Pour secourir, porter** un appareil respiratoire autonome ou, à défaut, un masque complet à cartouche (type ABEK EN 14387).
- **Consulter un médecin en urgence** même en l'absence de symptômes (difficultés respiratoires...).
- **En cas d'inhalation massive, appeler :**
  - SAMU (15 ou 112),
  - Pompiers (18),
  - Par SMS pour les sourds et malentendants (114).

## DANS TOUS LES CAS

- Faire une déclaration d'**accident du travail** (certificat médical nécessaire).
- Avertir l'**assistant de prévention** et consigner l'accident dans le **registre santé et sécurité**.
- Notifier l'accident au **conseiller de prévention**.
- Informer le **médecin du travail**.

## PRÉVENTION

- **Manipuler sous sorbonne CMR** (mutagène 2) en zone délimitée et balisée.
- **Porter des lunettes de protection** à coques latérales, des gants adaptés et une blouse fermée.
- **Utiliser uniquement** les solutions prêtes à l'emploi.